

Wpływ zwierząt na środowisko naturalne



Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze powodowane są amoniakiem z produkcji zwierzęcej

Roczna produkcja od trzody chlewnej:

- 98 tys. ton amoniaku
- 64 tys. ton metanu
- 63 mln ton dw. węgla



Oddziaływanie gazów:

- ▶ Obniżenie masy urodzeniowej
- ▶ Obniżenie liczby i sprawności plemników
- ▶ Zwiększenie śmiertelności
- ▶ Choroby układu oddechowego i krążenia
- ▶ Alergie



UREGULOWANIA PRAWNE

- ▶ Umowy międzynarodowe – Agenda 21 przyjęta w na szczycie ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. odnośnie zanieczyszczeń powietrza
- ▶ Uregulowania krajowe – Regulacja przyjęta w 25.10.2008r. Odnośnie obowiązku magazynowania obornika na płytach i gnojowicy w zbiornikach przez okres 6 miesięcy



Gospodarstwa ekologiczne

- ▶ Obsada max. do 2DJP/ha
- ▶ Świnie utrzymywane w systemie otwartym lub półotwartym
- ▶ Zakaz produkcji gnojowicy
- ▶ Ustawa o rolnictwie ekologicznym z 16 marca 2000r.



Programy rolnośrodowiskowe

Realizacja polityki rolnej opartej na systemie dopłat i dotacji dla rolnictwa za wprowadzenie korzystnych dla środowiska sposobów upraw i hodowli



WPR od 2015 roku

- ▶ Dyrektywa ptasia, dyrektywa siedliskowa, dyrektywa azotanowa
- ▶ Obszary Natura 2000
- ▶ Zazielenienie – dywersyfikacja upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ), utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)

