

Opieka nad lochą i prosiętami po porodzie



Laktacja

Pierwszą wydzieliną z gruczołu mlekowego jest siara bogata w białka odpornościowe - Globuliny. Skład siary ulega gwałtownej zmianie dlatego ważne jest podawanie jej niezwłocznie po narodzeniu.

W pierwszych godzinach życia immunoglobuliny nie są trawione przez przewód pokarmowy ponieważ enzymy trawienne są nieaktywne, dzięki czemu białka trafiają bezpośrednio do krwioobiegu.



Hierarchia stada

- ▶ Bezpośrednio po porodzie prosięta instynktownie przemieszczają się sutków matki.
- ▶ Chętnie zajmują przednie sutki często walcząc o nie
- ▶ Do 4 - 7 dnia prowadzą utarczki w celu ustalenia hierarchii w grupie
- ▶ Po tym okresie następuje stabilizacja i prosięta kolejno wracają do swoich sutków
- ▶ Po odsadzeniu jeśli zwierzęta są utrzymywane nadal w tych samych grupach to hierarchia się nie zmienia



Karmienie

- ▶ W pierwszym dniu locha karmi co godzinę
- ▶ Mleko wydzielane jest tylko przez 60 sekund
- ▶ Wydzielanie mleka poprzedza i kończy masaż wykonywany przez prosięta



Prosięta nad liczbowe

- ▶ W pierwszych dniach podzielić prosięta na dwie grupy i podsadzać je do lochy przemienne aby wszystkie miały dostęp do pokarmu
- ▶ W drugiej lub trzeciej dobie nad liczbowe prosięta (najsilniejsze) dosadzamy do innej lochy która ma wolne sutki lub do sztucznej mamki



Przebieg laktacji

- ▶ Trwa średnio 4 - 5 tygodni
- ▶ Szczyt laktacyjny przypada na 2 - 3 tydzień kiedy produkcja dobową wynosi 10 - 12 litry
- ▶ Całkowita produkcja w laktacji wynosi około 350 - 450 l mleka
- ▶ Mleczność lochy obliczamy na podstawie masy miotu w 21 dniu życia, która jest pomniejszona o masę urodzeniową
- ▶ 4 l mleka na 1 kg przyrostu prosięcia



Zaburzenia zdrowotne

- ▶ Przeciągające się porody powodujące niedotlenienie prosiąt - przeciwdziałać można podając oksytocynę po 4/5 narodzonym prosięciu
- ▶ Brak mleka u pierwiastek po porodzie - wywołane stresem, dwukrotne podanie oksytocyny znosi tę dolegliwość
- ▶ Bezdech u nowonarodzonego prosięcia - spowodowany zatkaniem dróg oddechowych błonami płodowymi, udrożnić drogi i podać kilka kropli - Pneumogenu



Zaburzenia zdrowotne

- ▶ Zespół MMA - bezmleczność wywołana zapaleniem gruczołu mlekowego, przeciwdziałanie to odpowiednie żywienie w okresie okołoporodowym i higiena w pomieszczeniach
- ▶ Kolibakterioza - infekcja bakteryjna przewodu pokarmowego kończąca się nagłymi upadkami spowodowana piciem gnojówki z powodu braku mleka u matki

