

Rodzaje tuczu trzody chlewniej



Rodzaje tuczu:

- ▶ Zbożowy
- ▶ Ziemniaczany
- ▶ Serwatkowy
- ▶ CCM
- ▶ Odpadkami



Tucz zbożowy



- ▶ Ziarno jest podstawowym komponentem paszy **(65 – 75%)**
- ▶ W żywieniu wykorzystuje się: jęczmień, żyto, pszenżyto, pszenżyto, pszenica, owies i kukurydza
- ▶ Zboża zawierają średnią ilość białka **(10 – 14%)** o niskiej zawartości aminokwasów ograniczających (głównie lizyny)
- ▶ Braki białkowe w paszy uzupełnia się koncentratami białkowymi
- ▶ W żywieniu stosuje się mieszanki pełnoporcjowe pochodzące z zakupu bądź produkowane w gospodarstwie



Tucz zbożowy



- ▶ Przyrządzanie i zadawanie pasz w tuczu zbożowym jest najłatwiejsze i najmniej pracochłonne
- ▶ Najoptimalniejsze jest mieszanie 2-3 zbóż wraz dodatkami pasz uzupełniających
- ▶ Udział jęczmienia w dawce bez ograniczeń
- ▶ Udział żyta w dawce do 30/40%,
- ▶ Udział pszenżyta do 50/70%
- ▶ Owsa nie powinno się stosować powyżej 20% ze względu na niską wartość pokarmową i wysoką zawartość włókna



Tucz zbożowy

- ▶ Wyróżnia się tucze 1, 2, 3, 4 – fazowe
- ▶ Najoptimalniejszy jest tucz 3 – fazowy oparty o mieszanki przemysłowe (**starter, grower, finiszer**)
- ▶ Białka strawnego w początkowych fazach tuczu powinno być około 14% do wagi 70kg, natomiast w końcowej fazie tuczu należy ograniczyć ilość białka do 12%.
- ▶ Energii na przyrost **1kg zużywa zwierzę około 40 MJ**



Tucz ziemniaczany



Ziemniaki są paszą węglowodanową wybitnie tuczącą i powodującą duże otłuszczenie tuszy przy nieprawidłowym zbilansowaniu dawki pokarmowej.

Przez cały okres tuczu nie należy stosować w żywieniu mniej, **jak 1 kg ziemniaków na sztukę , optymalne jest podawanie od 2 do 6 kg ziemniaków**

W żywieniu trzody wskazane jest stosowanie **ziemniaków parowanych** z dodatkiem soli kuchennej



Tucz serwatkowy



- ▶ Serwatka jest produktem ubocznym przemysłu mleczarskiego
- ▶ Zawiera laktozę, składnik mineralne oraz białko w zróżnicowanych ilościach
- ▶ Przez cały okres tuczu zwierzę wypija maksymalnie około **1500 litrów serwatki**
- ▶ Serwatka musi być uzupełniana paszą treściwą uzupełniającą
- ▶ Skarmiać należy wyłącznie serwatkę świeżą (max 1 tydzień trwałości)
- ▶ **Na 2 tygodnie przed końcem tuczy wycofać z dawki pokarmowej aby nie obniżyć jakości mięsa**



Tucz CCM

CCM – kiszone ziarno kukurydzy

Wilgotność ziarna przy kiszeniu 35 – 50%

Wartość energetyczna **1kg CCM – 7 MJ EM**

Stosuje się w żywieniu od 1 do 4 kg CCM

CCM powinien być uzupełniany paszami treściwymi, w szczególności koncentratem białkowym

W całym okresie tuczu zwierzę zjada **około 300 kg CCM**

CCM stosuje się głównie w żywieniu na mokro



W domu

- ▶ Scharakteryzuj tucz odpadkami?

