

Nazewnictwo Zootechniczne

Zwierząt gospodarskich



Owca domowa



- **maciorka** – dorosła samica owcy użytkowana rozplodowo;
- **baran** (tryk) – dorosły samiec użytkowany rozplodowo;
- **jagnię** – młoda owca;
- **skop** – wykastrowany samiec owcy, przeznaczony na tucz

Koza domowa

koza – dorosła samica

kozioł – dorosły samiec

cap – wykastrowany samiec

koźlę – młode kozy



Koń domowy



Nazwy koni w zależności od wieku:

- sysak – młody koń do około 6 miesiąca życia, odżywia się głównie mlekiem matki.
- odsadek – młody koń odłączony od klaczy matki
- źrebię – młody koń poniżej 1 roku.
- klaczka – samica konia w wieku 1-3 lat.
- ogierek – samiec konia w wieku 1-3 lat.
- klacz, kobyła – samica konia powyżej trzeciego roku życia.
- ogier – samiec konia powyżej trzeciego roku życia, zazwyczaj hodowany dla rozrodu.



- wałach – wykastrowany samiec.
- wnęter – samiec konia z wadą rozwojową, polegającą na niewłaściwym umieszczeniu jąder

Kura domowa (*Gallus gallus*)

- Pisklę (0-3 dni)
- Kurczę
- Kogut
- Kura
- Brojler
- Kapłon



Indyk zwyczajny

- Indyczęte – młode
- Indor – samiec
- Indora – samica
- Brojler - mieszaniec



Kaczka domowa

- Kaczęta – młode
- Kaczor – samiec
- Kaczka – samica
- Brojler – mieszaniec



Gęś domowa

- Gąsięta – młode
- Gąsior – samiec
- Gąska – samica
- Brojler gęsi



Pszczola miodna

- Królowa matka
- Trutnie
- Robotnice



Bydło domowe



krowa – dorosła samica

buhaj – dorosły samiec

wolec(wół) – wykastrowany samiec

cielę – młody osobnik bydła, od urodzenia do 6 miesiąca

jałówka – młoda samica, od 7 miesiąca do pierwszego wycielenia

jałówka cielna – młoda samica w pierwszej ciąży

pierwiastka – krowa po pierwszym wycieleniu

bukat – opasana młodzież bydłęca

opas – dorosły opasany osobnik

Świnie



- **knur** – samiec świni domowej zdolny do użytkowania rozplodowego;
- **locha (maciora)** – dorosła samica świni domowej użytkowana rozplodowo;
- **locha prośna (ciężarna)** – samica bez powtarzającej się rui, później z zewnętrznymi oznakami ciąży;
- **locha luźna (jałowa)** – samica po zakończonym okresie karmienia prosiąt, przed nowym zapłodnieniem;
- **locha karmiąca** – samica po wyproszeniu odchowująca prosięta do czasu ich odsadzenia;



- **locha użytkowa** – dorosła samica użytkowana w kierunku wykorzystania zdolności do rozmnażania;
- **locha zarodowa** – samica świni wpisana do ksiąg zwierząt zarodowych, użytkowana w kierunku wykorzystania zdolności do przekazywania cennych cech potomstwu;
- **prosię** – młoda świnią w wieku od urodzenia do 12. tygodnia życia;
- **prosię ssące** – młoda świnią w wieku od urodzenia do odsadzenia od matki (w wieku 4-8 tygodni);



- **prosię odsadzone** – młoda świnią po odłączeniu od maciory w wieku 12 tygodni;
- **warchlak** – młoda świnią w wieku 12-18 tygodni, o masie ciała 25-45 kg;
- **knurek hodowlany** – młody samiec wyselekcjonowany i przeznaczony do hodowli w wieku 4-8 miesięcy;
- **tucznik** – świnią od 4. miesiąca życia tuczona do określonej masy ciała (w zależności od rodzaju tuczu) następnie przeznaczana na ubój;
- **wieprz** – osobnik płci męskiej wykastrowany i przeznaczony na tucz.